

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Anti-PAK1 Monoclonal Antibody, Clone: [Clone: ADFA-16], Rabbit BOB-M00454

| | |
|--------------------------|--|
| Artikelname | Anti-PAK1 Monoclonal Antibody, Clone: [Clone: ADFA-16], Rabbit |
| Artikelnummer | BOB-M00454 |
| Hersteller Artikelnummer | M00454 |
| Alternativnummer | BOB-M00454-100UL |
| Hersteller | Boster Bio |
| Wirt | Rabbit |
| Kategorie | Antikörper |
| Applikation | FC, ICC, IF, IHC, IP, WB |
| Spezies Reaktivität | Human, Mouse, Rat |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human PAK1 The activated kinase acts on a variety of targets. Likely to be the GTPase effector that links the Rho-related GTPases to the JNK MAP kinase pathway. Activated by CDC42 and RAC1. Involved in dissolution of st |
| Produktbeschreibung | Boster Bio Anti-PAK1 Monoclonal Antibody catalog M00454. Tested in WB, IHC, ICC/IF, IP, Flow Cytometry applications. This antibody reacts with Human, Mouse, Rat.... |
| Klonalität | Monoclonal |
| Konzentration | Actual concentration vary by lot. Use suggested dilution ratio to decide dilution procedure. |
| Klon-Bezeichnung | [Clone: ADFA-16] |

| | |
|------------------------|---|
| Molekulargewicht | 73 kDa |
| Sensitivitaet | <10pg/ml |
| UniProt | Q13153 |
| Puffer | Rabbit IgG in phosphate buffered saline, pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol, 0.4-0.5mg/ml BSA. |
| Reinheit | Affinity-chromatography |
| Formulierung | Liquid |
| Application Verdünnung | WB 1:500-1:2000IHC 1:100-1:500ICC/IF 1:50-1:200IP 1:40FC 1:30 |